

RUTIN Trombosprofylax vid leverdonation samt njurdonation

Innehållsansvarig: Magnus Rizell, Överläkare, Läkare transplantation (magri2)

Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)

Denna rutin gäller för: Verksamhet Transplantation

Omfattar

- Öppen eller laparoskopisk njurdonation
- Leverdonation från levande donator

Trombosprofylax ges i form av

1. Rheomacrodex 500 ml peroperativt föregånget av 20 ml Promiten
2. Fragmin 5000 E s.c. x 1 dagligen under vårdtiden från första postoperativa dagen.

Särskild ordination krävs vid

TPK < 50

Krea > 2 x normalnivån

PK > 1,4

Vid heterozygoti för APC-resistens eller för prothombingenmutation

Fragminprofylax ges i 2 veckor eller eventuellt längre vid bristande mobilisering, infektion eller andra oförutsedda komplikationer. Vid annan ärftlig trombospre-disponerande riskfaktor skall profylaxbehandling diskuteras med koagulationsspecialist.

Referens

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004.

www.sos.se/fulltext/102/2004-102-3/sammanfattning.htm