

Doknr. i Barium 11757	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-02-21	Version 8
RUTIN			
AB0-inkompatibel njurtransplantation, förberedelse på hemortssjukhuset			
Innehållsansvarig: Marie Felldin, Överläkare, Läkare transplantation (marfe13) Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10) Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum			

Inför blodgruppsinkompatibel njurtransplantation med levande givare:

1. Tag förnyat korstest mellan donator och recipient drygt 1 månad före operationsdag. (Obs! Före Mabtherainfusion!).
2. Tag även nya blodgruppsantikroppstitrar (Antikroppar mot donatorns blodgrupp)
3. Ge 1 infusion rituximab (Mabthera®) i.v. 375mg/kvm kroppsyta enl separat PM. c:a 30 dagar före operationsdagen.
4. Starta behandling med p.o. mykofenolsyra (CellCept® eller aktuellt generiskt MMF) 10 dagar före planerad operation med 1 gram x2.
5. Pat skall ha välfungerande dialysaccess (AF fistel/graft eller CDK) inför immunadsorptionsbehandling när patienten läggs in på Transplantationscentrum.

[Länk till PM Mabthera>>>](#)