

Doknr. i Barium 12168	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-12-02	Version 4
Riktlinje Vård av tarmdonator pre- och peroperativt			
Innehållsansvarig: Gustav Herlenius, Universitetssjukhusö, Läkare transplantation (gushe2) Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10) Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum			

Se Donationspärmen www.sahlgrenska.se - sök organdonation-donationspärm

Speciella riktlinjer vid tarmdonation

Antibiotikaproylax påbörjas på IVA

- Meronem®
 - > 30 kg - 500 mg x 3
 - < 30 kg - 20 mg/kg x 3

Hormonsubstitution

- SoluMedrol®
 - 15 mg/kg (singeldos) Ges på IVA, snarast efter diagnostik av total hjärninfarkt.

Perfusion preoperativt

- Perfusion med Custodiol®.
 - Riktlinje - 50 ml/kg. Ska ske i samråd med kirurg.

Referenser:

Bugge JF. Brain death and its implications for management of the potential organ donor. Acta Anaesthesiol Scand 2009; 53: 1239-1250.

DeRoover A, Langnas A N. Surgical methods of small bowel transplantation. Curr Opin Organ Transplantation 1999; 4:335-342.

Herlenius G, Krantz M, Finkel Y, Meurling S, Olausson M. Tarmtransplantation – experimentell terapi som blivit realistiskt alternativ. Läkartidningen 2004;38:2874-2878.

Kosmach B. Intestine Transplantation. Organ Transplant. www.medscape.com/viewarticle/436543 [tillgänglig 11 mars 2010]

Kotsch K, Ulrich F, Reutzel-Selke A, Pascher A, faber W, Warnick P, Hoffman S, francuski m, Kunert C, kuecuk O, Schumacher G, Wesslau C, Lun A, Kohler S, Weiss S, Tullius SG, Neuhaus P Pratschke J. Methylprednisolone therapy in deceased donors reduces inflammation in the donor liver and improves outcome after liver transplantation: a prospective randomized controlled trial. Ann Surg 2008; 248: 1042-1050.

Kuman N. New strategies to improve outcome of children awaiting small bowel transplantation. Washington DC, USA: American Transplant Congress; 2002. p 374.