

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare
Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare
Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

Giltig från: 2022-09-01
Giltig till: 2024-08-30

Ortostatisk test

Patienten bör vila liggande i minst 5 minuter.
Blodtryck och puls mäts **manuellt** i liggande, i stående omedelbart och vid 1, 2 och 3 minuter och vid ev. symtom. Längre registrering görs om blodtrycket är i sjunkande eller puls i stigande. Eventuella symtom anges.

Datum, tid:	Blodtryck	Puls	Symtom
Liggande			
Stående 0 min			
Stående 1 min			
Stående 2 min			
Stående 3 min			

--	--	--	--

(Bilaga 2 till riktlinje "Synkope - riktlinje vid oklar orsak")

Information om handlingen

Handlingstyp: Blankett, övrig

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-44

Version: 5.0

Giltig från: 2022-09-01

Giltig till: 2024-08-30