

## Remissrekommendation

### Tuberkulos, aktiv

---

#### Allmän information

Tuberkulos (TB) kan ge aktiv sjukdom i flera av kroppens organ och ge diversifierad symtombild efter lokalisation. Lungtuberkulos är den enda smittsamma formen. Det är mycket viktigt att uppmärksamma denna i tid för att minimera smittspridning. Symtom på tuberkulos är nattliga svettningar, viktnedgång, feber/subfebrilitet i kombination med t.ex. långvarig hosta (lungtuberkulos). Tuberkulos i lymfkörtel, spondylit, artrit, buk, urogenitalt, meningit/tuberkulom är andra exempel på manifestationer av sjukdomen.

#### Önskade uppgifter på remissen

**Frågeställning:** Tuberkulos, aktiv. Övertag för utredning och ev behandling.

#### Anamnes

1. Patientens födelseland/uppväxtland, ankomst till Sverige, tolkbehov?
2. Föreligger symtom på tuberkulos med nattliga svettningar, viktnedgång, feber  
+ långvarig hosta (> 3v)\*, hemoptys, buksmärta (med ev. diarré), lymfkörtelförstoring, spondylit/artrit eller CNS symtom?  
\* ange antal veckor med hosta
3. Har patienten behandlats för tillståndet i primärvården? Med vilka läkemedel?
4. Finns känd TB-exposition?
5. Genomgången TB, behandling?
6. Föreligger vistelse i fängelse, smittland östra Europa/ Asien?
7. Andra sjukdomar och aktuella läkemedel?
8. Om lungröntgen är genomförd, anges svaret.
9. Finns PPD eller Quantiferon anges detta.
10. Finns små barn eller spädbarn i hushållet?

OBS! Om patienten har misstänkt lungtuberkulos rekommenderas att remissen faxas akut eller telefonkontakt med dagbakjouren, infektionskliniken.

#### Övriga upplysningar

- Enligt ”Regelverk – Remiss inom hälso- och sjukvård”