

Gäller för: Kvinnoklinik, Kvinna och barn gemensam, Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Aldona Gabrielaitiene, (aldga1), Överläkare

Granskad av: Zeljka Mustapic, (zelm1), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-04-15

Giltig till: 2026-04-15

Bilirubin hos nyfödda

Sammanfattning

Handläggning av bilirubin hos nyfödda på SÄS.

Barn som vårdas/samvårdas på BB

[Bilirubin hos nyfödda inom obstetrike.pdf \(vgregion.se\)](#)

Barn som vårdas på neonatalavdelning

Risken för hjärnskada ökar vid

- hemolytisk sjukdom
- lågt s-albumin
- acidosis
- hypoxi
- sepsis/infektion
- dehydrering

UNDER DESSA OMSTÄNDIGHETER BEHÖVER
BILIRUBINGRÄNSERNA FÖR BEHANDLING SÄNKAS MED 50
µMOL/L!

För prematura barn (< vecka 37) ska individuella bilirubinkurvor skrivas ut ([Treatment threshold graphs, NICE](#)). Dessa kurvor är EJ riskkurvor och samma regler gäller med att sänka bilirubingränserna för behandling!

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Zeljka Mustapic, vårdenhetsöverläkare, neonatalavdelning, SÄS, Borås

Aldona Gabrielaitiene, överläkare, SÄS Borås

Fastställt av

Erica Cedervret Nilsson, verksamhetschef, verksamhetsområde Kvinna och Barn, SÄS, Borås

Nyckelord

Hyperbilirubinemi, ikterus, fototerapi, ljusbehandling, transcutan mätning, BiliChek, bilichek, gulsot

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Kvinnoklinik, Kvinna och barn gemensam, Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Aldona Gabrielaitiene, (aldga1), Överläkare

Granskad av: Zeljka Mustapic, (zelmu1), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-598

Version: 10.0

Giltig från: 2024-04-15

Giltig till: 2026-04-15