

Gastroskopi, förberedelser inför undersökning av inneliggande patienter, SÄS

Sammanfattning

Riktlinjen beskriver förberedelser inför gastroskopi för inneliggande patienter och omfattar såväl barn som vuxna.

Förändringar sedan föregående version

Avsnitt om blodförtunnande medicin har uppdaterats.

Förutsättningar

Remiss

Gastroskopiremiss faxas till endoskopienheten, fax **4009**.

Inneliggande undersökning

Endoskopipersonalen ringer till vårdavdelningen och meddelar när det är dags för patientens undersökning.

Patienten ska transporteras på bårvagn (i undantagsfall i säng) till endoskopimottagningen. **OBS!** Var uppmärksam på risk för trycksår! Vidta förebyggande åtgärder och informera mottagande personal.

Genomförande

Förberedelser

- Patienten ska vara fastande från kl. 24:00 natten före undersökningen.
- Klara drycker är tillåtet fram till 2 timmar före undersökningen (inte mjölk eller välling).
- Perifer venkateter (PVK); helst i höger arm.

Blodförtunnande medicin

Blodförtunnande medicin bör i de flesta fall sättas ut inför koloskopi. Lågdos ASA (Trombyl) behöver dock aldrig sättas ut.

Beroende av vilken typ av blodförtunnande medicin som patienten har, varierar tiden som medicinen ska vara utsatt. För trombocytaggregationshämmare (Plavix, Clopidogrel, Brilique, Efient) rekommenderas ofta 7 dagar. För antikoagulantia däremot är tiden kortare. För Waran ofta 5 dagar medan det för NOAK-preparat (Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana) räcker det med 2(–3) dagar. Lågmolekylärt heparin i terapeutisk dos (>5000E) pausas 24 h före undersökning, medan profylaktisk behandling i lågdos (≤5000E) kan ges kvällen före undersökning.

Indikationen för den blodförtunnande behandlingen såväl som indikationen för undersökning kan också ha betydelse för hur lång tid det går att göra uppehåll. Observera att det finns tillstånd där den blodförtunnande medicinen inte kan sättas ut.

Avdelningsläkaren är ansvarig för hantering av läkemedel inför koloskopi. Vid eventuella frågor kontaktas endoskopienheten, tfn **2790**.

Nationella riktlinjer:

<https://svenskgastronterologi.se/knowledge/handlaggande-av-antitrombotiska-lakemedel-hos-patienter-som-genomgar-planerad-endoskopisk-diagnostik-eller-terapi>

Efter undersökningen

- Patienten återgår omgående till avdelningen efter undersökningen.
- Patienten ska vara fastande 1 timma efter undersökningen.

Vid frågor, kontakta endoskopienheten:

Borås: tfn **2790**

Skene: tfn **8012**

Fax nr: **4009**

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Linda Hägmark Hultin, sjuksköterska, endoskopienheten, SÄS

Jorge Arroyo Vázquez, överläkare, VO kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals, SÄS

Anders Lasson, överläkare, VO medicin, SÄS

Remissinstanser utgåva 1

Verksamhetschefer, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Gastroskopi, mag-tarmundersökning, endoskopi, gastrointestinal undersökning, bilddiagnostik

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jorge Arroyo Vázquez, (jorar3), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-84

Version: 6.0

Giltig från: 2023-11-16

Giltig till: 2025-11-14