

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Giltig från: 2022-09-28

Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Giltig till: 2024-09-20

Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

1.

Cordarone (Amiodaron)

Cordarone är ett läkemedel som används vid behandling av rytmrubbningar i hjärtat. Cordarone används framför allt för att hjälpa till att hålla hjärtat i sin normala (sinus) rytm. Det är en effektiv medicinering men den kan ibland ge biverkningar.

Bieffekter

Hud

När du tar Cordarone kan huden få en gråaktig/blå nyans. Det här kommer att återgå till det normala när man slutar använda Cordarone, men kan ta lång tid. Medan du tar Cordarone kan du bli mer känslig för solbränna. Undvik solning och använd solskydd och hatt för att förhindra den här bieffekten. Eftersom Cordarone är kvar i kroppen under lång tid kan det vara nödvändigt att fortsätta använda solskyddskräm under ett par månader efter avslutad behandling.

Sköldkörteln

Sköldkörteln producerar ett hormon som styr kroppens ämnesomsättning. Cordarone kan påverka sköldkörteln och göra den både överaktiv (detta sker hos cirka 2 % av personerna som tar Cordarone) eller underaktiv (detta sker hos cirka 6 % av personerna som tar det). Sjukvården kommer regelbundet att ta blodprover för att kontrollera sköldkörtelfunktionen. Om du får extrem trötthet, rastlöshet eller andra konstiga symtom bör du kontakta din läkare för att diskutera detta. Både en överaktiv och låg sköldkörtelfunktion kan behandlas med läkemedel.

Ögon

Små avlagringar kan bildas i hornhinnan i ögat (den klara yta som täcker pupillen och iris). De här avlagringarna är inte skadliga. Du kan dock se effekten av sådana ögonavlagringar genom att titta in i starkt ljus på natten t.ex. vid bilkörning. Bland personer

som tar Cordarone upplever 1 av 10 en blåaktig halo (synfenomen). Det här är inte heller skadligt.

2.

Lungor

Cordarone kan orsaka problem med förtjockningar (fibros) av vissa strukturer i lungorna. Om du får tillkomst av andfåddhet bör du omedelbart kontakta din läkare.

Levern

Cordarone påverkar i sällsynta fall leverns funktion, vilket kan förbättras genom att minska dosen av Cordarone. Sjukvården kommer att kontrollera leverns funktion vid de rutinmässiga blodproverna.

Uppföljning

Cordarone är en mycket effektiv medicin och din läkare kommer att skriva ut den om han/hon anser att den är den bästa medicinen för dig. Ovan nämnda biverkningar, om än ovanliga, visar att kontroller är viktiga. Du kommer att regelbundet behöva lämna blodprov för att se att din sköldkörtel- och leverfunktion inte påverkas. Dock är det viktigt att du själv hör av dig vid nytillkomna oförklarliga symtom.

Kontaktuppgifter

Informationen är framtagen av processteamet Att vårda patienter med hjärtrytmrubbningar

Ansvarig: Björn Fredriksson, överläkare/processledare
Telefon: Södra Älvsborgs Sjukhus 033 – 616 10 00

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation, referensexemplar

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-31

Version: 5.0

Giltig från: 2022-09-28

Giltig till: 2024-09-20