




Kontakt
Ögonkliniken
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla

Telefon
Sjuksköterska 010-435 31 00


Text: Anna Chouliara, leg. läkare
Ögonkliniken, Uddevalla sjukhus

Irit



Du har fått besked av din läkare att du har irit eller regnbågshinneinflammation, en inflammation på regnbågshinnan, den färgade delen av ögat. Vid en inflammation av regnbågshinnan blir ögat rött, rinner, man blir mycket ljuskänslig och har ont framför allt när man tittar på nära håll då pupillen drar ihop sig. Synen kan påverkas i olika grader.

Symtomen varierar från patient till patient och även hos samma patient från gång till gång, så de behöver inte alltid vara lika uttalade. Barn till exempel brukar inte ha några symtom alls.



Iriten behandlas med kortison i form av droppar eller salva. Dropparna brukar man ta intensivt, varje timme de första dagarna och sedan, när inflammationen har minskat, kan man trappa ut successivt. Kortisondroppar vid en irit skall man alltid minska successivt för att förebygga återfall efter avslutad behandling.

Inflammationen kan orsaka sammanväxningar mellan pupillen och linsen, något som din läkare behandlar eller motverkar med pupillvidgande droppar som du får här på mottagningen men ibland även som förebyggande behandling. Under behandling med pupillvidgande blir synen lite sämre, men den återhämtar sig så fort man slutar med droppar.

Oftast drabbas ett öga åt gången, men iriten kan återkomma på samma eller andra ögat. Det är viktigt att inflammationen upptäcks och behandlingen inleds så snabbt som möjligt. Obehandlad irit kan orsaka problem med permanent synförsämring och högt tryck.



Varför inflammation i regnbågshinnan uppkommer är oklart. Det kan vara relaterat till några virusinfektioner. Åkomsten är vanligare bland personer som har reumatiska eller inflammatoriska sjukdomar (t ex reumatoid artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar, Mb Bechterew) och de brukar också få mer långvariga inflammationer.

Men de flesta som drabbas av irit är för övrigt friska och det finns ingen utlösande faktor till inflammationen. Därför finns inget behov av vidare utredning om du har fått några enstaka iriter som läker ut utan problem.