

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Sigvard Eriksson Mörck, (siger1), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2023-01-20

Giltig till: 2025-01-19

Höftfraktur – kvarstående höftfrakturmisstanke efter negativt röntgensvar

Rutinen ingår i höftfrakturprocessen SÄS

Sammanfattning

Radiologiskt metodval för uteslutande eller bekräftande av höftfraktur.

Förändringar sedan föregående version

Förlängning av giltighetstiden.

Förutsättningar

Trauma mot höftled med negativa röntgenfynd, men med klinik som talar för fraktur. Förekommer i en icke försumbar frekvens. En radiologisk utredningsalgoritm är framtagen för klarläggande.

Genomförande

Om röntgenundersökning som görs på grund av misstanke om en höftfraktur inte visar någon skelettskada ska vid kvarstående frakturmisstanke en MR-undersökning av höften göras.

På jourtid då MR-lab är stängt ska den negativa röntgenundersökningen kompletteras med datortomografi. Om denna inte heller visar någon fraktur kan den behöva kompletteras med en MR-undersökning nästkommande vardag.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Sigvard Eriksson, överläkare/processledare höftfrakturprocess

Remissinstanser (utgåva 1)

Verksamhetschef, neuro-rehabiliteringsklinik, SÄS

Verksamhetschef, ortopedklinik, SÄS,

Verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Medicinsk beredningsgrupp, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Kvarstående höftfrakturmisstanke, negativt röntgensvar, MR-undersökning, CT-undersökning, magnetkamera, datortomograf, lårbenshalsbrott, höftfraktur, höftfrakturmisstanke

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Sigvard Eriksson Mörck, (siger1), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-55

Version: 4.0

Giltig från: 2023-01-20

Giltig till: 2025-01-19