


# باکتری های مقاوم تهدیدی برای تندرستی ما هستند

هرگونه استفاده از داروهای آنتی بیوتیک باعث مقاوم شدن باکتری ها می شود. با استفاده از داروهای آنتی بیوتیک در مواردی که واقعاً ضروری هستند می توان روند مقاومت باکتری ها را متوقف کرد.



آیا می خواهید مطالب بیشتری بدانید؟

[www.1177.se](http://www.1177.se)




[www.antibiotikaellerinte.se](http://www.antibiotikaellerinte.se)




[www.skyddaantibiotikan.se](http://www.skyddaantibiotikan.se)



وجود باکتری در ادرار سالخوردگان - چرا برای همه داروی آنتی بیوتیک تجویز نمی شود؟




# بالغ بر نیمی از سالخوردگان در ادرار خود باکتری دارند بی آنکه برای آنها ناراحتی ایجاد شود



ولی اگر فرد احساس کند بیمار است و حالش خیلی بد باشد چکار باید کرد؟

مهم است که خدمات درمانی یک تشخیص جامع از تندرستی فرد انجام دهد تا سایر علل ناراحتی ها نادیده گرفته نشوند یا اشتباهاً بعنوان عفونت ادراری تشخیص داده نشوند

آیا می توانید برای فقط اطمینان خاطر آنتی بیوتیک تجویز کنید؟




برای بیماران مهم است که در موارد غیر ضروری آنتی بیوتیک دریافت نکنند.

داروهای آنتی بیوتیک می توانند باعث عوارض جانبی مانند اسهال شوند. داروهای آنتی بیوتیک همچنین باکتری هایی که هم در مجاری ادرار و هم در روده تأثیر محافظتی دارند را نیز از بین می برند.

ضمناً این احتمال وجود دارد که به باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک کمک شود. باکتری مقاوم می توانند بعداً باعث عفونت هایی شوند که درمان آنها دشوار است.

علت اینکه فرد احساس خستگی می کند، نگران یا گیج و منگ است چیست؟

پیش از این اغلب تصور می شد که اینگونه علائم به عفونت ادرار بستگی دارد، ولی امروزه می دانیم که اینگونه ناراحتی ها علل دیگری دارند.



پس چگونه می توان دانست که عفونت ادراری است؟

هنگام بروز ناراحتی های جدید، مانند سوزش هنگام ادرار کردن و احساس پی در پی کاذب ادرار داشتن ممکن است علت عفونت ادراری باشد و در اینصورت آنتی بیوتیک در اغلب موارد کمک می کند.

اگر بطور مشخص مشکوک به عفونت ادراری باشیم آزمایش ادرار گرفته می شود.

