

Obavijest za pacijente

Vrijedi od 06. 05. 2022.

Lokalni tretman sa traneksamskom kiselinom (Cyklokapron)

Vi se liječite sa lijekom za razrjeđivanje krvi i zato može biti prikladno da nakon stomatološkog zahvata koristite traneksamsku kiselinu kao lokalni tretman kako bi se smanjilo eventualno krvarenje.

Traneksamska kiselina

Kada nakon zahvata zagrizete kompresu natopljenu traneksamskom kiselinom Cyklokapron) povećava se sposobnost lokalnog zgrušavanja krvi u ustima, bez da se povećava opasnost stvaranja krvnih ugrušaka u ostalom dijelovima tijela.

Prije zahvata:

Ako uzimate lijek varfarin (Waran) potrebno je napraviti svježu pretragu PV (INR)-vrijednosti. Uzorak se uzima jedan dan prije stomatološkog zahvata ili ujutro istoga dana kada će se izvesti zahvat.

U slučaju manjeg krvarenje nakon zahvata:

- Izbjegavajte žvakanje ili pranje zuba četkicom u tretiranom području tokom procesa zarastanja (obično 1- 2 sedmice nakon zahvata).
- Ako su vam potrebne tablete protiv bolova pitajte stomatologa koji lijek je prikladan za vas.
- Otopite jednu šumeću tabletu Cyklokapron u 10 ml (2 čajne kašike) vode. Natopite kompresu sa otopinom i stavite je na liječeno područje i grizite je 30 do 60 minuta. Ako je potrebno možete to ponoviti 3 – 4 puta na dan tokom jednog do tri dana nakon zahvata i u skladu sa preporukom stomatologa.
- Ako to ne pomogne obratite se svom stomatologu. Ako je stomatološka klinika zatvorena, nazovite Obavijesti o zdravstvu (Sjukvårdsupplysningen) na broj telefona 1177.

Imate li pitanja?

Obratite se svom stomatologu.

Stomatolog:

Telefon: