


Vårdhygieniska aspekter vid vaccination mot covid-19

Regional instruktion

Utarbetad av Vårdhygien i Västra Götalandsregionen

Giltighet: 2020-12-22 till 2021-12-22 version 2

- Tillämpa basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt dvs arbeta så att steriliteten på läkemedlet, spruta, spets mm bibehålls.
- Vaccinationerna ska genomföras på ett sådant sätt att trängsel och smittspridning förhindras. Varje patient måste ges möjlighet att hålla avstånd och erbjudas munskydd. Följ regional rutin Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg.
- Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Handskar för att skydda händerna vid läkemedelsberedning. Eventuella handskar i samband med vaccination ersätter inte handdesinfektion.
- Använd visir och munskydd. De behöver inte bytas mellan patienter under arbetspasset så länge de inte kontamineras, berörts med händer eller tagits av.
- I regel behöver inte huddesinfektion utföras. Vid vaccination av gravt immun-supprimerad patient desinfektera hudområdet för vaccinationen med alkoholbaserad injektionstork i minst 5 sek och lufttorka under minst 30 sekunder.
- Avfall: Använda injektionssprutor, kanyler och vaccinampuller ska slängas i behållare för farligt avfall och hanteras som riskavfall. En och samma behållare kan i samband med massvaccination användas med etikett "Skärande/stickande smittförande avfall".



Intramuskulär injektion, Vårdhandboken

Relaterad information

Socialstyrelsen [SOSFS 2015:10 Föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg](#)
[Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg](#)
Vårdhandboken [Huddesinfektion- Ingrepp med liten risk för infektion](#)
Vårdhandboken [Injektioner- översikt, subkutan respektive intramuskulär injektion](#)