Mässling

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns.
Viruset sprids via luften när en smittad person hostar och nyser.

Sjukdomsförlopp och symtom

Smittotillfälle

Symtomen börjar 7 - 18 dagar senare med hög feber, hosta, snuva och ögonirritation


Små utslag kan några dagar senare uppträda i munnens slemhinna

Efter 3 - 5 dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. Det börjar oftast i ansiktet och sprider sig sedan ner mot bål och ben

Utslagen och febern försvinner efter några dagar

Komplikationer

Öroninflammation
1/10 med mässling får öroninflammation



Hjärninflammation
Drabbar 1/1000 och kan orsaka bestående men

Lunginflammation
1/20 insjuknar med lunginflammation

Död
1 - 2/1000 mässlingsfall i världen avlider som en följd av sjukdomen

Vaccin skyddar

Det finns ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).
Vaccinet ingår i allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982.
De som som kan vara mottagliga för mässling är:

- Barn under 18 månaders ålder.
- Personer som avstått vaccination.
- Personer födda mellan 1960 - 1981 som exempelvis endast fått en dos vaccin.

För att sjukdomarna inte ska få fäste i befolkningen krävs att över 90-95 procent är immuna.

