

# Provtagningsmall STI

## Frågor att ställa inför provtagning

STI	Klamydia	Mycoplasma G	Gonorré	Hepatit B	Hepatit C	Hiv	Syfilis	Kondylom	Herpes	Kommentar
Tidigaste tid för provtagning efter smittotillfälle. (Tidigare om symtom.)	7* (-10) dagar	10 dagar	7 dagar	2 + 6 månader	2 + 6 månader	2 v + 6 v Hivstest med snabb svar 8 v	2 v + 3 månader*			
Har/har haft urinvägsbesvär	●	◐	◐							Ev. urinodling
Har/har haft flytningar	●	◐	◐							
Har/har haft mellanblödningar	●									
Har/har haft blödning i samband med samlag	●	◐						!		Ev. undersökning av läkare
Har/har haft ont nedtill i buken/underlivet	●	◐	●							Ev. undersökning av läkare
Har sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet?	●					○	◐	!	◐	Ev. undersökning av läkare (syfilissår kan också förekomma oralt) Klinisk bild avgör
Har svullna lymfkörtlar	●					●		!		Ev. undersökning av läkare
Har ögonbesvär/ensidig konjunktivit	●		◐							Prov tas från konjunktiva, ev. till ögonläkare
Har halsbesvär efter oralsex	○		◐							Tag ev. svalgprov klamydia vid långdragna halsbesvär efter oralsex.
Har inom de senaste 12 månaderna haft vaginalt, oralt, analt sex med ny eller tillfällig partner	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐			Tag prov vaginalt, i svalg, rektalt, urogenitalt utifrån sexuell praktik. Noggrann anamnes krävs.
Smittskyddslag = smittspårningsskyldighet	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Om ja, undersökning och behandling gratis för patienten
	*De flesta är positiva efter 7 dagar. Partnerbehandling efter provtagning. Svar behöver ej inväntas.	Aktuell(a) partner provtas, behandlas enligt provsvar.	Vid positivt prov skall patient till Hud/STI	Vid positivt prov skall patient till infektionsklinik	Vid positivt prov skall patient till infektionsklinik	Vid positivt prov direktkontakt med infektionsklinik	Vid positivt prov skall patient till Hud/STI			
Har haft sex utomlands	●	!	●	●	●	●	◐	!		Sjukdomar har olika prevalens i olika länder.
Annat	Kontrollprov efter beh. är i normalfallet ej nödvändigt. Också risk för falskt positivt svar. Vid positiv klamydia analt och anala besvär, tänk LGV (Lymfocytära venerum). Kontakta Hud/STI.	Prov ska inte tas som screening, vg se flödes-schemat på baksidan. Prov bör alltid tas om fortsatta besvär vid negativ klamydia eller trots klamydiabehandling.	Alltid odling före behandling! NAAT/PCR-prover skall alltid verifieras.	Endast HbsAg	Endast anti HCV	Vid postexpositionsprofilax, prov 6 veckor efter avslutad, 4-veckors, behandling.	* Prov (Syfilis TP/Treponema screening) behöver normalt ej upprepas om det gått mer än 3 månader, men antibiotikabehandling kan fördröja svar. Vid fortsatt misstanke, kontakta Hud/STI (→ prov 6 mån?)	Noggrann anamnes för annan STI-provtagning	För symtomlindring: Behandling helst inom 72 tim. Noggrann anamnes för annan STI-provtagning	
Rek. behandling	Doxycyklin Vid graviditet se Läkemiddelsverkets rekommendation	Azitromax Obs! 5-dagars-behandlingen	Ska behandlas på Hud/STI	Ev. vaccination		Ev. postexpositionsprofilax ord. av infektionsläkare efter individuell bedömning inom 4 tim (senast 36 tim)	Ska behandlas på Hud/STI	Behandling Se REK-lista	Behandling Se REK-listan.	

Angelägenhetsgrad för provtagning

● = Hög

◐ = Medel, överväg provtagning efter noggrann anamnes

○ = Låg (inte 0)

! = Tänk på