

Barn med kraniosynostos diagnostiseras oftast för sent i Sverige

Vi skriver till alla Sveriges barnläkare och BVC för att erbjuda hjälp med diagnos av avvikande skallform på barn. Du är kanske inte själv direkt berörd av detta brev, men vi vore ändå mycket tacksamma om du ville hjälpa till att sprida informationen i detta brev.

Förutsättningen för effektiv och skonsam behandling av kraniosynostos är en tidig korrekt diagnos. Kraniosynostos är ju en relativt ovanlig diagnos och det är därför inte underligt om man kan känna sig tveksam när man träffar på ett spädbarn med ovanlig skallform.

För medarbetare i kraniofacialteamet på Sahlgrenska räcker vanligen *fotografier* av barnet för en säker diagnos. Röntgen är sällan nödvändigt och fördröjer. Dessutom tolkas röntgenbilderna inte så sällan felaktigt, vilket fördröjer ännu mer.

Vi vill hjälpa till. Skicka som attachment per e-mail digitala foton av barnet **tagna framifrån, profil, bakifrån och uppifrån**, så att pannan syns till:

skallform.su@vgregion.se

Föräldrar måste informeras och ge sitt tillstånd till att bilderna skickas till oss. Bifoga uppgifter om ålder. Vi försöker svara inom 1-2 dagar.

Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig endast till vården. Vi svarar med diagnos och förslag och vi ser fram emot kontakt.

Göteborg i januari 2008



Claes Lauritzen
Professor
Kraniofaciala enheten
Verksamheten för plastikkirurgi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg