

Informacije za pacijente

losartan	Cozaar/Comp, Klomentan/Comp, Losarstad/Comp, Losartan, Losatrix, Losartan/Hydrochlorothiazide, Losartan/hydroklortiazid, Marozid
eprosartan	Teveten/Comp
valsartan	Diovan/Comp, Valsartan, Valsartan/hydrochlorothiazide, Valsartan/Hydroklortiazid Valsartore/Comp, Valtsu/Comp, Exforge, Entresto
irbesartan	Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta, Ifirmacombi, Irbesartan, Irbesartan/hydrochlorothiazid, Karvea
kandesartan	Atacand/Plus, Candemox Comp, Candesarstad/Comp, Candesartan, Candesartan/Hydrochlorothiazid, Candexetil/Comp, Kairasec, Kandrozid,
telmisartan	Micardis/Plus, Lesamor, Telmisartan/Hydroklortiazid, Tolura, Tolucombi
Lijekove za liječenje dijabetesa	
metformin	Metformin, Comptact, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentaduetto, Komboglyze, Synjardy, Vokanamet, Xigduo
empagliflozin	Jardiance, Synjardy, Glyxambi
kanagliflozin	Invokana, Vokanamet
dapagliflozin	Forxiga, Xigduo, Qtern
ertugliflozin	Steglatro, Segluromet, Steglujan
Druge lijekove	

Lijekovi protiv bolova u obliku gela ili spreja se slobodno mogu koristiti. Tablete i tečni lijekovi sa paracetamolom (Alvedon, Pamol, Panodil, Paracetamol, Paracut, Pinex, Quramol, Theremin) se takođe mogu koristiti.

Nikada ne prelazite preporučene doze!

Napravila Terapijska grupa za Starije i lijekove avgust 2018. g., verzija 2

Vama koji uzimate

LIJEKOVE

koji nose veliki rizik od ozbiljnih nuspojava pri akutnim stanjima kod dehidracije

- *proljev*
- *povraćanje*
- *visoka temperatura (preko 38 °C)*
- *val vrućine*
- *akutna bolest sa teškoćama da se jede ili pije*

Neki od lijekova koji se koriste za liječenje srčanih oboljenja, visokog pritiska, bolova i dijabetesa mogu dovesti do ozbiljnih nuspojava ukoliko se koriste kada je balans tekućine u tijelu poremećen.

Zapamtite:

Postoji rizik za ozbiljne nuspojave ovih lijekova u slučaju dehidracije kao što su povraćanje, proljev, povišena temperatura, visoka toplota ili stanja koja čine da ne možete jesti ili piti.

Rizik za ozbiljne nuspojave se povećava s godinama ili kod smanjene funkcije bubrega.

Kako reagirati u slučaju dehidracije?

Ako uzimate neke od gore navedenih lijekova, trebate napraviti pauzu u Vašem liječenju u situacijama u kojima može doći do dehidracije. Ako tegobe prestanu, liječenje se ponovo može nastaviti direktno nakon prestanka tegoba.

Obratite se zdravstvenim ustanovama ukoliko ste nesigurni!

.....

Ako uzimate sljedeće lijekove:

Lijekove protiv bolova (analgetike)		
diklofenak	Diclofenak/T, Dicuno, Diklofenak/T, Eeze, Eezeneo, Ignorin, Voltaren/T, Arthrotec/forte	
piroxikam	Brexidol	
tenoxicam	Alganex	
meloxicam	Meloxicam	
ibuprofen	Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipren, Nurofen Apelsin	
naproxen	Alpoxen, Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen, Pronaxen, Vimovo	
ketoprofen	Orudis/Retard	
dexibuprofen	Tradil	
dexketoprofen	Enantyum, Kettese	
celecoxib	Celebra, Celecoxib	
etoricoxib	Arcoxia, Turox	
nabumeton	Relifex	
Lijekove za izlučivanje tekućine (diuretike)		
bendroflumetiazid	Bendroflumetiazid, Salures, Centyl K/mite	
hidroklortiazid	Esidrex, Hydrochlorothiazide, Hidroklortiazid	
klortalidon	Hygropax	
metolazon	Metolazon	
furosemid	Furix/Retard, Furosemid, Impugan, Lasix Retard	
bumetanid	Burinex	
torasemid	Torasemid, Torem	
spironolakton	Spirolactone, Spironolakton	
eplerenon	Eplerenon, Inspra	
amilorid	Amilorid	
Lijekove za liječenje srčanih bolesti i povišenog pritiska		
digoxin	Digoxin, Lanoxin	
kaptopril	Captopril	
enalapril	Enalapril, Renitec, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide, Linatil Comp, Linatil Comp Mite, Renitec Comp	
lisinopril	Lisinopril, Zestril, Lisinopril/Hydrochlorotiazid	
perindopril	Coversyl Novum	
ramipril	Ramipril, Triatec, Ramipril/Hidroklorotiazid	
fosinopril	Fosinopril	
kinapril	Accupro Comp	