

Brist på PPI (protonpumpshämmare) injektion

Det råder brist på preparat för intravenös PPI-behandling, både esomeprazol och pantoprazol, inom VGR. Dessa preparat bör därför tillsvidare endast användas på strikt indikation.

Intravenösa PPI bör förbehållas patienter med misstanke om blödande ulcus. På övriga indikationer ges PPI peroralt eller i sond.

För patienter på IVA som behandlas på indikationen stressulcusprofylax kan behandling ges med PPI i sond eller med Zantac iv. Esomeprazol enterotabletter (de flesta fabrikat) har i FASS anvisningar om hur det ska lösas för att ges i sond, liksom esomeprazol (Nexium) enterogranulat.

För närvarande finns Zantac injektion att tillgå, även om brist kan uppstå även för detta läkemedel. Preliminärt kommer en leverans av Esomeprazol SUN injektion i början av juni.

PPI injektion ska inte rutinmässigt ges på akutmottagningen på svag misstanke om ulcusblödning och ska i de flesta fall inte ges till patienter som har känd cirros och misstanke om blödning från varicer.

För terapigrupp Mage-tarm
Antal Bajor, ordförande, överläkare

Susanne Mirshahi, sekreterare, apotekare
Susanne.mirshahi@vgregion.se

Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Peter Amundin
läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter

Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev