

Faryngotonsillit

Handläggning för vuxna och barn > 3år

Vanliga symtom vid en virusorsakad luftvägsinfektion är t. ex. snuva, hosta och heshet. Då bör provtagning för GAS* undvikas.

Diagnostiska kriterier (enligt Centor)

1. Feber $\geq 38,5$ grader
2. Ingen hosta
3. Förstorade, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna
4. Beläggning på tonsillerna**

0-2 kriterier

Inget snabbtest för GAS

Symtomatisk
behandling vid
behov

3-4 kriterier

Ta snabbtest för GAS

Negativt*** Positivt

Symtomatisk
behandling vid
behov

Antibiotika och vid
behov symtomatisk
behandling

* GAS (grupp A-Streptokocker).

** Barn 3-6 år utvecklar sällan beläggningar på tonsillerna orsakade av GAS. Rodnade, svullna tonsiller kan användas synonymt till beläggningar i denna åldersgrupp.

*** Negativt test för GAS kan förväntas hos cirka 50 % av patienterna med ≥ 3 Centorkriterier.

Källa: Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2012;23(6):18–25.

Vid avvikande kliniskt status eller allmänpåverkan, överväg andra diagnoser.
Vid kraftig allmänpåverkan: akut remiss till sjukhus!