

Piptazgranskning infektionsavdelningen SÄS 2017

Martin Älverbrandt

Infektionsläkare


Verktygsläkare

SÄS

Mentometerfrågan

65-årig man med prednisolonbehandlad PMR (12,5mg/dygn). Inkommer med med 1,5 dygns anamnes på 40-graders feber utan fokala symtom eller tecken till organpåverkan i labb eller vitala parametrar.

Inbördes andel av iv antibiotika på SÄS



Vilka rekommenderas Piptaz i Borås?


- Svår sepsis eller septisk chock
- Oklar infektion med GFR < 20 vilket exkluderar Nebcina
- Pneumoni med >2 poäng enligt CRB-65
- Sjukhusförvärvad sepsis och pneumoni
- Akut buk

Verkttygsläkarens Piptazgranskning Infektionskliniken 2017


- Månadsvis journalgranskning av patienter som vårdats på Infektionsavdelningen och ordinerats piptaz vid inläggningen eller senare

Hur bra följer vi våra antibiotika riktlinjer?

Piptaz på Infektionsavdelningen SÄS




● Första ordination ● Byte till Piptaz



Indikationer för piptaz enligt infektionsverktyget


● Okänt fokus ● Pneumoni ● UVI ● Akut buk ● Annat



Antal
138


Vilket antibiotika hade granskaren ordinerat?

● Piptaz ● Bensylpc+ Nebcina ● Bensylpc ● Nebcina ● Cloxacillin






Andel adekvata Piptaz ordinationer enligt riktlinje





Blododling


● Utförd ● Positiv ● Fynd täckt av BpC + Nebcina



Odlingsfynd	Antal
E coli	14
Pneumokocker	6
Övriga gramneg	4
GAS	3
Staph a	3
Enterokocker	2
GBS	1
Listeria	1
Pasteurella	1
Salmonella	1
Totalt	36

Resistentia	Antal
E coli	2
Enterokocker	2
Totalt	4

Inbördes andel av iv antibiotika på SÄS



Diskussion

- Regelbunden återkoppling bidrar till ökad följsamhet
- Enhetligt arbetssätt skapar trygghet och trovärdighet