

## نود أن ننبه كافة الآباء والأمهات بشأن مرض الحصبة



طفح جلدي أحمر اللون

إن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر الهواء من حاملي المرض. إن أولى الأعراض التي تظهر هي السعال والخُمى واحمرار العينين. وبعد 3 - 4 أيام يحدث طفح جلدي في صورة بقع حمراء تظهر على وجه الشخص المُصاب وجسمه (انظر الصورة).

وبالنسبة للأطفال الصغار الذين لم يتم تطعيمهم ضد المرض فإنه من الممكن أن يُصبحوا بحالة مرضية خطيرة، ويكونوا في حاجة إلى الحصول على الرعاية الطبية. يُمكنك حماية طفلك من الإصابة بالحصبة من خلال اتباع برنامج التطعيم المُقدم من قبل مركز رعاية الطفولة (BVC). يتم تقديم التطعيم الأول بعمر 18 شهر، ويتم أخذ الجرعة الثانية عندما يكون الطفل في الصف الأول أو



احمرار العينين

و إن الحصبة مرض شائع في العديد من البلدان. ويُمكن للحصبة أن تُصيب أيضاً البالغين الذين لم يُصابوا بالحصبة من قبل أو الذين لم يحصلوا على تطعيم الحصبة. في حال كنت ستسافر أنت وطفلك خارج السويد فمن الهام حصولكم على التطعيم قبل السفر.

يُرجى الاتصال بدليل الرعاية الصحية 1177 (Vårdguiden 1177) في حال كنت تشبه بإصابة طفلك أو إصابتك بالحصبة

وبما أن المرض شديد العدوى فإنه يتوجب عليك تجنب التواصل مع الآخرين.

يُرجى الاتصال بدليل الرعاية الصحية 1177 (Vårdguiden 1177) قبل قيامك بزيارة المستشفى | مركز الرعاية الصحية. من الهام أن يتم فحص الطفل في غرفة مخصصة له حتى لا يتم نقل العدوى إلى الآخرين.

يُرجى الاتصال بدليل الرعاية الصحية 1177 (Vårdguiden 1177) للحصول على المشورة:

اللغة السويدية: 1177

اللغة العربية: 0771 – 1177 90