

# Den lilla kirurgin

Gunnar Rimbäck  
160519

# Lokalanestesi

- Fungerar även i infekterad vävnad.
- Tunn nål, spruta långsamt.
- Böj gärna nålen.
- Stor volym.
- Markera incisionslinjen med penna.
- Bedöva först subcutant. Sedan intracutant i incisionslinjen.
- Detta ger blixtsnabb effekt.
- Bedövningen tar alltid.

# Operera lipom

- Lättast på armar och ben.
- Tänk på hudnerverna.
- Rita ut incisionslinjen.
- Snittets längd = lipomets längd.
- På armar och ben kan lipomen oftast pressas ut.
- Operera de som är  $< 5$  cm.

# Operera aterom

- Lägg ovalär excision i huden över ateromet.
- Bedöva runt ateromet och i utritad incisionslinje.
- Vinkla kniven, lyft i huden, debridera med saxen i rätt skikt.
- Ofta i skalpen. Raka huden. Tejpa undan långt hår.
- Incidera infekterade aterom i lokalanestesi.
- Antibiotika behövs inte.

# Königs operation

- Behandla nageltrång med lateral evulsio, ej med antibiotika.
- Königs operation vid recidiverande besvär.

# Operationstips

- Markera tå och tåside.
- Bedöva med 2x5 ml Carbocain 10 mg/ml utan adrenalin.
- Vänta minst 15 min.
- Uppdraget knä, fotsulan mot operationsbordet.
- Hålduk runt tån.
- Slang runt tån – ”blodtomt fält”.
- Gör lateral – partiell evulsio. Incidera huden. Håll undan huden med 2 pincetter. Skär bort nagelanlaget in till benet. Sätt 1 sutur i huden. Förband.