

STICK- & SKÄRSKADA

ÅTGÄRDER VID EXPONERING AV BLOD



SKADAD HUD: Desinfektera (alkoholbaserat desinfektionsmedel)

STÄNK I MUNNEN: Skölj (alkoholbaserat desinfektionsmedel, kranvatten)

STÄNK I ÖGON: Skölj (ögondusch, NaCl, kranvatten)

CHECKLISTA FÖR PERSONAL

1. BEDÖMNING OCH PROVER

Kontakta ansvarig läkare för smittsamhetsbedömning av patient och ev. postexpositionsprofylax för personal (se styrdokument). Vid varje tillbud/skada tas prov på den inblandade patienten och utsatt personal.

Vid okänd smittkälla, se punkt 3.

Patient:

- Informera patient och inhämta medgivande till provtagning. Dokumentera i journal.
- BE EN KOLLEGA** utföra provtagningen.
- Beställ provtagning i Meliors labmodul: via mall "Stick/Skär Patient".
- Markera provet med akutsvar och telefonnummer. Vid kommentar, skrivs: "Stickskada från denna patient till personal".
- Lämna provet till Unilabs och meddela personalen att provet skall **ANALYSERAS INOM 24H.**

Personal:

- 0-prov (1 serumrör) tas på den utsatta personalen.
- PERSONALENS PROV SPARAS I KYL.**
- Invänta/bevaka patientens provsvar.
- Skriv avvikelse- och skadeanmälan.

2. NEGATIVT PROVRESULTAT

Är patientens prov negativt avslutas utredningen.

0-PROVET FRÅN PERSONAL KASSERAS.

3. POSITIVT PROVRESULTAT

Är patientens prov positivt, om det inte kunnat analyseras eller om smittkällan är okänd:

Personal:

- Om positivt prov för HIV, hepatit eller patienten bedöms som riskpatient skall infektionsläkaren kontaktas av ansvarig läkare.
- Kontakta infektionsmottagningen/infektionsjouren som tar över ansvaret för personalen, som nu blir patient.
- Personalens prov skickas för analys.
- Infektionsmottagningen är svarsmottagare och ansvarig infektionsläkare skall stå som ordinator av proverna.
- Använd mall "Stick/Skär Personal" i Meliors labmodul.

I de fall personalens provsvar är positiva, kontakta läkare vid infektionskliniken och ev. kurator.