

تداوی موضعی با ترانگزامیک اسید (سیکلوکاپرون)

شما تحت تداوی با ادویات رقیق کننده خون هستید و بنابراین ممکن است استفاده از ترانکسامیک اسید (سیکلوکاپرون) برای تداوی موضعی پس از انجام دادن عملیات دندانها برای کاهش خونریزی مناسب باشد.

ترانگزامیک اسید

بعد از عملیات دندان با فشار گرفتن تکه گاز که با محلول ترانگزامیک اسید (سیکلوکاپرون) پوشیده شده است، توانایی لخته شدن خون به صورت موضعی در حفره دهن افزایش می یابد، بدون اینکه خطر تشکیل لخته های خون در بقیه بدن افزایش یابد.

قبل از عمل:

اگر با وارفارین (واران) تحت تداوی قرار دارید پس باید مقدار جدیدی (INR) PK وجود داشته باشد.

در صورت خونریزی جزئی بعد از عمل:

- از جویدن یا برس کردن در ناحیه تداوی شده در طول فرآیند بهبودی (معمولاً 2 الی 1 هفته پس از عمل) خودداری کنید.
- اگر به دواي ضد درد نیاز دارید، پس میتوانید از داکتر دندان خود بپرسید که کدام دوا برای شما مناسب است.
- 1 گولی جوشان سیکلوکاپرون در 10 میلی لیتر آب (2 قاشق چایخوری) حل می شود. تکه گاز را در محلول تر کنید و آنرا در ناحیه تداوی شده برای 30 الی 60 دقیقه بگذارید. در صورت لزوم میتوان این کار را 3 الی 4 بار در روز برای مدت 1 الی 3 روز پس از عمل طبق دستور داکتر دندان تکرار کرد.
- اگر این کار کمکی نکرد پس با داکتر دندان خود در تماس شوید. اگر کلینیک دندان بسته باشد پس میتوانید که از طریق شماره تلفون Sjukvårdsupplysningen 1177 تماس بگیرید.

آیا پرسش دارید؟

با داکتر دندان تان در تماس شوید.

..... داکتر دندان:

..... شماره تلفون: