

STI	Klamydia	Gonorré	Hepatit B	Hepatit C	Hiv	Syfilis	Mycoplasma G	Kondylom	Herpes	Kommentar	
Tidigaste tid för provtagning efter smittotillfälle. (Tidigare om symtom.)	7 dagar		2 mån och omprov vid 6 mån för säkert resultat.		2 v och omprov vid 6 v för säkert resultat. Snabbtest hiv 8 v.	2 v och omprov vid 3 mån* för säkert resultat.	10 dagar			För att ge säkra provsvar måste prov tas med hänsyn till tidsangivelse.	
Urinvägsbesvär	●				Hivtest erbjuds frikostigt till alla					Ev. urinodling	
Flytningar	●										
Mellanblödningar	●										Ev. undersökning av läkare
Blödning i samband med samlag	●										Ev. undersökning av läkare
Ont nedtill i buken/underlivet/pungen	●										Ev. undersökning av läkare
Sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet/anus	●						● Syfilissår kan förekomma oralt		Klinisk bild avgör	Klinisk bild avgör	Ev. undersökning av läkare
Svullna lymfkörtlar	●										Ev. undersökning av läkare
Ögonbesvär/ ensidig konjunktivit	●										Prov tas från konjunktiva, ev. till ögonläkare
Halsbesvär efter oralsex	●										Tag svalgprov klamydia/gc vid långdragna halsbesvär efter oralsex.
Har inom de senaste 12 månaderna haft vaginalt, oralt, analt sex med ny eller tillfällig partner	●		●	●			●				Tag prov vaginalt, i svalg, rektalt, urogenitalt utifrån sexuell praktik. Noggrann anamnes krävs.
Har haft sex utomlands	●		●	●	●	●				Sjukdomar har olika prevalens i olika länder.	
Smittskyddslag = smittspårningsskyldighet	Ja Partnerbehandling efter provtagning. Svar behöver ej inväntas.	Ja Vid positivt prov skall patient remitteras skyndsamt till Hud/ STI.	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej Partnerbehandling efter provtagning rekommenderas. Behandlas bara vid positivt svar.	Nej	Nej	Smittskyddslagen innebär för dessa sjukdomar att provtagning och behandling är gratis.	
Annat	Kontrollprov efter beh. är i normalfallet ej nödvändigt. Också risk för falskt positivt svar. Vid positiv klamydia analt och anala besvär, tänk LGV (Lymfocytära granuloma venereum). Kontakta Hud/STI.	OBS Ska alltid behandlas på Hud/ STI där odling tas före behandling.	Endast HbsAg Rekommendera vaccination till män som har sex med män (msm) och personer som injicerar droger, kostnadsfritt.	Endast anti-HCV OBS! Anti-HCV kvarstår positivt efter utläkt infektion men ger ingen immunitet	Ev. postexpositionsprofylax ordinerar efter bedömning. Skyndsamt kontakt.	* Prov behöver normalt ej upprepas om det gått mer än 3 månader efter smittotillfälle. Antibiotikabehandling kan fördröja, kontakta Hud/ STI	Provet ska inte tas som screening. Prov bör alltid tas om fortsatta besvär vid negativ klamydia/gc eller trots klamydia/gc-behandling.		För symptomlindring: behandling helst inom 72 tim.		
Rek. behandling	Doxycyklin Vid graviditet se Läkemiddelsverkets rekommendation		Ev. vaccination Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik.	Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik.		Vid positivt prov skall patient remitteras till Hud/ STI	Azitromax Obs! 5-dagars-behandlingen	Behandling Se REK-lista	Behandling Se REK-listan.		

Namn _____

Personnummer _____

Mobil _____

1. Kön?

- Kvinna
- Man
- Annat
- Vill ej uppge

2. Varför söker du/varför vill du testa dig?

- För säkerhets skull
- Besvär
- Kontaktad av partner
- Smittspårning

3. Hur har du haft sex det senaste året?

- Analt
- Oralt
- Vaginalt
- Annat

	Ja	Nej
4. Besvär?		
urinvägsbesvär/ont när du kissar		
flytningar		
mellanblödningar		
blödning i samband med sex		
ont nedtill i buken/underlivet/pungen		
sår, utslag, blåsor, klåda i underliv/pung/anus		
ömma lymfkörtlar		
ögonbesvär		
halsbesvär		
5. Har du under det senaste året haft analt, oralt, vaginalt sex med en ny eller tillfällig partner?		
6. Har du haft sex utomlands?		
7. Önskar du information om hur du skyddar dig?		