

Utbildning – modern behandling av typ 2-diabetes

- Hur ska vi använda de "nya" läkemedlen vid typ 2-diabetes?
- Ordnat införande av empagliflozin (Jardiance, Synjardy) vid typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom
- Kontinuerlig blodsockermätning vid typ 2-diabetes

Inbjudan riktar sig till samtliga allmänläkare, diabetologer, diabetessjuksköterskor och verksamhetschefer på vårdcentralerna i VGR. Kardiologer och neurologer som arbetar med stroke är också välkomna.

Utbildningstillfällen

<u>Ort</u>	<u>Datum</u>	<u>Lokal</u>
Borås	12/9 och 16/10	Elin Odencrantssalen, SÄS
Göteborg	9/10 23/10	Lagerbladet, Sahlgrenska sjukhuset Järneken, Östra sjukhuset
Skövde	5/9 och 6/11	Insikten, SkaS
Trollhättan	19/9 och 25/9	Ägget, NÄL

För samtliga datum gäller tiden kl. 13.00 - 16.00 (med fikapaus)

Anmälan

Välkommen med din anmälan i regionkalendern: <http://regionkalender.vgregion.se>
Utbildningen är kostnadsfri.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av:

Margareta Berzén, margareta.berzen@vgregion.se, Ordf Sektorsrådet Allmänmedicin

Peter Fors, peter.fors@vgregion.se, Ordf Terapigrupp Diabetes

Victoria Carter, victoria.carter@vgregion.se, Samordnare Regionala Diabetesrådet

Stig Attvall, stig.attvall@vgregion.se, Ordf Regionala Diabetesrådet

Förslag till förberedelse

[REKlistan 2018](#)

[Utvidgat terapiråd; Ordnat införande empagliflozin](#)

Bakgrund

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017), LäkeMedelsverkets nya behandlingsrekommendationer (2017) samt i regionens REKlista (2018) betonas vikten av att individualisera valet av läkemedel vid typ 2-diabetes. Studier har visat att de "nyare" läkemedlen har klara fördelar i förhållande till SU-preparat och insulin avseende risk för hypoglykemier, insulinkoma och viktökning.

Två preparatgrupper (SGLT2-hämmare och GLP1-analoger) har också visat på en kliniskt signifikant minskad risk för hjärtinfarkt, stroke och för tidig död vid samtidig etablerad hjärt-kärlsjukdom. Regionen har därför beslutat att rekommendera empagliflozin (SGLT2-hämmare) vid typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom och även att göra det inom ramen för ett ordnat införande under 2018-2020.

Sektorsråden i allmänmedicin och internmedicin samt Regionala Diabetesrådet har ansökt om ett ordnat införande av FreeStyle Libre för patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och som har ett Hba1c över 70 mmol/mol eller återkommande allvarliga hypoglykemier. Detta i enlighet med NT-rådets rekommendationer.

Välkommen!

Regionala terapigruppen Diabetes i samarbete med Regionala Diabetesrådet, sektorsråden i Allmänmedicin och Hjärtsjukvård samt regionala terapigruppen Hjärta-kärl