

Obligatorisk bilaga till remiss för plastikkirurgisk bedömning av vävnadsöverskott på buken

För alla patienter som är i behov av bukplastik ska en realistisk målvikt vara framtagen i överenskommelse med patient och behandlande läkare (t ex obesitaskirurg, allmänläkare, gynekolog). Vid stigande BMI ökar komplikationsrisken, varför BMI<25 alltid ska eftersträvas! **Inför remittering ska målvikten vara uppnådd och patienten skall ha varit viktstabil i minst 6 månader**

Vi kräver absolut rökstopp innan patienten kommer till plastikkirurgisk mottagning för bedömning av vävnadsöverskott!

Alla rubriker nedan ska vara ifyllda och ovanstående kriterier måste vara uppfyllda för att remissen skall beaktas.

Namn: _____ **Personnummer:** _____

Aktuell kroppslängdcm	Aktuell vikt (målvikt): kg
Aktuellt BMI [(vikt i kg)/(kroppslängd i meter) ²]		Rökare ja/nej	
Hur länge har viktstabilitet förelegat (min 6 mån)		Senaste förlossning (månad/år)	
Antal genomgångna graviditeter			

Subjektiva besvär

Objektiva fynd

Sociala faktorer (arbete, fritid, sjukskrivning etc.)

Andra uppgifter om läkemedel eller sjukdomar (negera eller specificera):

Diabetes mellitus

Högt blodtryck

Hjärt-kärlsjukdom

Tidigare kirurgi

Gastroesofageal- reflux

Behandlingskrävande depression

ätstörningar

Aktuella läkemedel