

# STICK- & SKÄRSKADA ÅTGÄRDER VID EXPONERING AV BLOD



**SKADAD HUD:** Desinfektera (alkoholbaserat desinfektionsmedel)

**STÄNK I MUNNEN:** Skölj (alkoholbaserat desinfektionsmedel, kranvatten)

**STÄNK I ÖGON:** Skölj (ögonduch, NaCl, kranvatten)

## CHECKLISTA FÖR PERSONAL

### 1. TA PROVER

Vid varje tillbud/skada tas prov på den inblandade patienten och utsatt personal. Detta kan ske på den egna arbetsplatsen. **Vid okänd smittkälla, se punkt 3.**

#### Patient:

- Kontakta ansvarig läkare för smittsamhetsbedömning och ev. postexpositionspylax (se Vårdhandboken). Informera patient och inhämta medgivande till provtagning. Dokumentera i journal.
- BE EN KOLLEGA** utföra provtagningen.
- Beställ provtagning; S-HBsAg, S-antiHBc, S-anti HCV, S-HIV ag/ak.
- Markera provet med akutsvar och telefonnummer. Vid kommentar, skrivs: "Stickskada från denna patient till personal".
- Skicka provet till Unilabs Skaraborgs Sjukhus.

#### Personal:

- 0-prov (1 serumrör) tas på den utsatta personalen.
- PERSONALENS PROV SPARAS I KYL.**
- Invänta patientens provsvar.
- Skriv avvikelse- och skadeanmälan.

### 2. NEGATIVT PROVRESULTAT

Är patientens prov negativt avslutas utredningen.

**0-PROVET FRÅN PERSONAL KASSERAS.**

### 3. POSITIVT PROVRESULTAT

Är patientens prov positivt, om det inte kunnat analyseras eller om smittkällan är okänd:

#### Personal:

- Om positivt prov för HIV, hepatit eller patienten bedöms som riskpatient skall infektionsläkaren kontaktas av ansvarig läkare.
- Kontakta infektionsmottagningen/infektionsjouren som tar över ansvaret för personalen, som nu blir patient.
- Personalens prov skickas för analys.
- Infektionsmottagningen är svarsmottagare och ansvarig infektionsläkare skall stå som ordinator av proverna.
- Beställ provtagning: S-HBsAg, S-antiHBs, S-anti HCV, S-HIV ag/ak. Markera provet med akutsvar och telefonnummer till infektionsmottagningen/jouren.

I de fall personalens provsvar är positiva, kontakta läkare vid infektionskliniken och ev. kurator.