

اطلاعات در مورد داروی آرام بخش در طول درمان دندان

داروی آرام بخش 20 (Midazolam) دقیقه قبل از درمان مریض در دندانسازی برای آرام کردن نگرانی و تشویش بکار میرود. همچنین تاثیر آن برای آرام کردن عضله و بالانس بدن که باید در طول زمان در نظر گرفت.

حافظه در طول زمان درمان واضح نمی باشد به خاطر اینکه دارو اثر میگذارد. کودکان در زمان قبل و بد درمان غمگین و ناراحت میشوند. خیلی مهم میباشد که در طول درمان خاطره خوب بسازید تا وقتی به حالت عادی بر می گردن را به یاد بیاورند.

مصرف مواد غذایی

در نظر داشتن مواد غذایی ساده 2 ساعت قبل درمان.
(عصاره گریپ فروت)

بد درمان

تاثیر مصرف درمان دارو چندین ساعت در بدن میماند. گاهی لازم است حداقل 1 ساعت باید در درمانگاه نگهداری شوند.

بزرگسالان

اجازه رانندگی کردن ندارید حداقل 12 ساعت بعد از مصرف دارو اجازه راندن ندارید. بزرگسالان حتما باید یک همراه داشته باشند در برگشت به خانه از KLINIKEN.

کودکان

در زمان برگشت به خانه باید از صندلی و کمربند ایمنی استفاده شود با داشتن همراه حتی در طول روز. و در موقع خوابیدن کودک باید به پهلو قرار گیرد و از بازی در بیرون خانه و چرخ سواری بالا پریدن خوداری شود.

اگر سوال دارید زنگ بزن.

.....
.....