

Laboratoriemedicin

TRANSFUSIONSKOMPLIKATION

| | |
|---|----------------|
| Avdelning | Patient |
| | Diagnos |
| Bedömning av reaktionens svårhetsgrad <input type="checkbox"/> Lätt <input type="checkbox"/> Måttlig <input type="checkbox"/> Svår | |
| Vid svår reaktion, kontakta omedelbart laboratoriemedicin | |
| Transfusion <input type="checkbox"/> Erythrocyter <input type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Erythrocyter tvättade <input type="checkbox"/> Trombocyt koncentrat <input type="checkbox"/> Övrigt | |
| Aktuella symptom <input type="checkbox"/> Enstaka utslag <input type="checkbox"/> Blodtrycksfall <input type="checkbox"/> Generell rodnad <input type="checkbox"/> Blodtrycksstegring <input type="checkbox"/> Urtikaria <input type="checkbox"/> Pulsstegring <input type="checkbox"/> Quinke ödem <input type="checkbox"/> Arytmi <input type="checkbox"/> Petechier <input type="checkbox"/> Tryckkänsla ö bröstet <input type="checkbox"/> Astma <input type="checkbox"/> Yrsel <input type="checkbox"/> Anafylaktisk chock <input type="checkbox"/> Kramper <input type="checkbox"/> Illamående/ kräkning <input type="checkbox"/> Diarré <input type="checkbox"/> Dyspne <input type="checkbox"/> Lumbal smärta <input type="checkbox"/> Cyanos <input type="checkbox"/> Hämoglobinuri <input type="checkbox"/> Frysning <input type="checkbox"/> Ikterus <input type="checkbox"/> Temperaturstegning _____ °C Började kl _____ Duration _____ h | |
| Enhet/er ² Tappningsnummer | |
| Förlopp Transfusionen påbörjades Den _____ kl _____ Och avbröts kl _____ Då hela enheten/ ca _____ mL givits | |
| Rapport lämnad av _____ | |
| Blodprover för utredning tagna ³ <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |
| Provtagning har skett enligt föreskrifter för blodserologiska undersökningar | |
| _____ Läkare/ sjuksköterska/ biomedicinsk analytiker | |
| Övrigt ¹ _____ _____ Har tidigare haft transfusionskomplikation Datum: _____ I form av: _____ _____ | |

Upplysningar om 1-3 finns på baksidan! ↗

Anmärkning:

Datum _____ Sign: _____

Laboratoriemedicin

UPPLYSNINGAR

Ta kontakt med laboratoriemedicin vid oklarheter.

Reaktion vid transfusion av alla typer av blodkomponenter

En blankett, Transfusionskomplikation skall alltid fyllas i och sändas till laboratoriemedicin.

Övrigt ¹

- Andra förekommande symtom
- Diagnos om den kan tänkas påverka förloppet
- Ev. medicinering som kan påverka reaktionen
- Tidigare misstänkta transfusionskomplikationer skall anges.

Enhet/er ²

- Skriv in enhetens/ernas tappningsnummer (om flera komponenter har transfunderats samtidigt) på angiven plats.
- Ange andra pågående/precis avslutade infusioner.

Lämna blodenheten, väl försluten i separat plastpåse.

Uppgifter om patientens symtom vid inträffad transfusionskomplikation, avgör vilka åtgärder som vidtas med de inlämnade proverna.

Eventuell utredning utförs efter samråd med laboratoriemedicin.

Vid misstanke på bakteriell kontamination av blodenhet skall den lämnas till laboratoriemedicin omgående. Blododling tas på patienten och ombesörjs av avdelningen.

Reaktioner på plasma och trombocyter

- Fyll i blankett Transfusionskomplikation och lämna den samt blodpåsen till laboratoriemedicin.

Reaktioner på erythrocyter ³

Vid måttlig och svår reaktion:

- ta 2 st. 7 mL EDTA- rör på patienten. Patientidentiteten skall vara intygad på blankett Transfusionskomplikationer.
- lämna prover och ifylld blankett till laboratoriemedicin. Lämna blodenheten, väl försluten i separat plastpåse.